

2주 이상 기침하면 결핵검진



결핵(Tuberculosis)이란?

결핵균(*Mycobacterium tuberculosis*)의 감염에 의해 생기는 호흡기 감염병입니다. 주로 폐에 발생하지만 다른 신체부위에도 질환을 일으킬 수 있습니다.



결핵의 감염경로

- 전염성 결핵환자의 기침, 재채기 또는 대화 등으로 배출된 결핵균이 공기를 통해 다른 사람 폐로 들어가게 되면 결핵균에 감염됩니다.



결핵의 증상, 진단과 치료



2주 이상 기침,
발열, 수면 증
식은 땀, 체중감소 등

흉부 X 선 검사
가래(객담) 검사

* 결핵 검진은 가까운 보건소나
의료기관에서 받으세요


6개월 이상 꾸준히 치료하면
완치가 가능하며, 치료 후
약 2주가 경과하면
전염성이 소실됩니다.

결핵예방접종(BCG 접종) 바로 알기

- 우리나라는 모든 신생아(생후 4주 미만)에게 BCG 접종을 권고하고 있습니다.
- BCG 접종은 소아에게 발생 가능성이 높은 중증 결핵 예방을 위한 것으로, 결핵이 평생 동안 예방되는 것은 아닙니다.



기침할 땐
옷소매로!



결핵과 잠복결핵감염 바로알기

결핵

증상 유무

2주 이상 기침,
발열, 체중감소 등

잠복결핵감염

증상 없음

전염성 여부

기침, 대화를 통해
공기 중으로 전파

전염성 없음

환자 여부

환자
(반드시 치료)

환자 아님
(치료 권고)

신고 의무

신고
(법적 의무)

해당 없음



잠복결핵감염자는 면역력이 약해지면
결핵으로 발병할 수 있어 검진과 치료로
결핵발병을 예방하는 것이 중요합니다.

발행년월일 2018.03.12

결핵예방은
검진이지~EASY!


2주 이상
기침하면
결핵검진



질병관리본부
KCDC

1739
질병관리본부 풀센터

결핵ZERO



2주
기침
결핵검진