

대한민국 어린이라면,

인플루엔자 무료 예방접종을 잊지마세요!





무료 예방접종, 어떻게 받아야 하나요?



2012. 9. 1 ~ 2017. 8. 31 출생아

생후 6~59개월 이하 어린이



지정의료기관 및 일부 보건소에서

2018. 4. 30 까지 접종

단, 접종일 기준 **생후 6개월부터 접종이 가능하며**,
6개월이 도래하는 어린이는 가능한 빨리 접종을 완료하도록 합니다.

인플루엔자 백신을 **처음 접종 받거나**, 지난절기 **1회만 접종 받은 경우**
4주 간격으로 2회 접종을 완료해주세요.



인플루엔자가 유행 중인데 지금이라도 예방접종을 받는 것이 좋나요?



현재 인플루엔자 유행이 증가하고 있고,
늦은 봄까지 유행이 지속될 수 있으니,
지금이라도 예방접종을 받지 않은 어린이들은
항체형성 기간인 2~4주를 고려해
서둘러 예방접종을 받으시기 바랍니다.



인플루엔자 접종시 금기 및 주의사항은 무엇인가요?

이런 어린이들은

예방접종을 받아서는 안됩니다!

과거 백신 접종 후 중증 알레르기 반응이 있었던 경우
백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우



이런 어린이들은

예방접종 시 주의하세요!

인플루엔자 백신 접종 후 6주 이내에
길랭-바레증후군이나 다른 신경계 증상이 있었던 경우
중등증 또는 중증 급성질환자는 증상이 호전될 때까지 접종 연기





예방접종 전, 후 **주의 사항**

예방접종 **전**



반드시 **의사의 예진**을 받아야 합니다.

* 이전에 백신/백신 성분에 대한
중증 알레르기 반응이 있었다면, **예방접종 금기대상**입니다.

예방접종 **후**



20~30분간 접종기관에 머물며
이상반응 여부를 관찰 후 귀가 합니다.

귀가 후 특별한 증상이 없는지 적어도 **3시간 이상**을 관찰합니다.

접종부위는 청결하게 유지합니다.



예방접종 후 이상반응이 나타나면?

예방접종 후

발생 가능한 이상반응

국소 이상반응 : 접종부위가 빨갱게 부어오름, 부종, 통증 등

전신 이상반응 : 발열, 근육통, 두통 등



예방접종 후

예방접종 부위의 통증, 부종, 근육통, 발열, 메스꺼움과 같은 경미한 증상은 대부분 **2~3일 이내 호전**됩니다.

증상이 심해지거나 장기간 지속되는 경우 즉시 의사의 진료를 받습니다.





인플루엔자에 대처하는 **건강한 생활습관**

1



흐르는 물에 비누로
30초 이상 손을 씻어야 합니다.

2



기침을 할 때에는
옷소매로 입과 코를 가려야 합니다.

3



기침이 심하거나 인플루엔자로
진단 받을 경우 **마스크를 착용** 해 주세요

4



인플루엔자 의심증상이
있는 경우 진료를 받습니다.