



안전한 예방접종을 위해 이것만은 꼭 지켜주세요

예방접종 준비 시

- 건강 상태가 좋은 날에 예방접종 받기
- 장시간 기다리지 않도록 혼잡하지 않은 시간에 사전 예약 하기
- 지정의료기관을 확인하고 유선으로 예약일 확인 후 방문하기
*대기시간 단축을 위해 예방접종예진표 작성하여 내원을 권고합니다.
- 접종 대상자, 보호자는 발열 등 호흡기 증상이 있을 시 내원 전 반드시 의료기관에 알린 후 접종 연기하기



예방접종 받을 때

- 의료기관 방문 시 접종 대상자, 보호자 모두 마스크 착용
- 의료기관 방문 시 비누와 물로 손씻기, 손소독제로 손위생 실시하기
- 대기하는 동안 수분을 충분히 섭취하고 안정 취하기
- 예방접종 전 예진 시, 현재 아픈 증상이 있거나 평소 앓고 있는 만성질환이 있다면 반드시 의료인에게 말하기



예방접종 받은 후

- 접종 후 15~30분간 접종기관에서 이상반응이 있는지 관찰하고 귀가하기
- 접종 당일 몸에 무리가 가지 않도록 쉬고,
접종 후 2~3일간은 몸 상태를 주의 깊게 살피기
*예방접종 후 접종 부위의 통증, 빨갛게 부어오름, 부종이나 근육통, 발열, 메스꺼움 등 경미한 이상반응은 접종 후 일시적으로 나타날 수 있으며 대부분 1~2일 이내 호전됩니다.
- 접종 후 고열이나 호흡곤란, 두드러기, 심한 현기증 등이 나타나면 즉시 의사의 진료 받기

*접종 후 어린이가 계속 보채고 잘 먹지 않거나 평소와 다른 모습을 보일 경우 의사의 진료를 받으세요.





안전한 예방접종을 위한 의료기관 준수사항

사전 준비

- 의료기관 방문자가 환자들의 접촉을 최소화할 수 있도록 사전 예약 받기
- 급성이상반응 발생 시 원활한 대응을 위해 에피펜*등
응급처치 의약품 및 장비를 사전에 구비하기
- *에피펜 구매방법: '20.01.01부터 의약품도매업체를 통해 직접 구매 가능합니다.
- 건강한 사람과 아픈 사람의 진료 동선 및 공간이 겹치지 않도록 하기
- 의료기관에 들어오기 전 접종자의 발열 여부 등을 확인하기
- 의료기관 입구에 손소독제를 비치하기



접종 시

- 의료진은 KF94 또는 N95 이상의 호흡기 보호구, 의료용 장갑 착용하기
- 접종대상자, 보호자 등이 의료기관을 방문한 경우 입구에서
마스크 착용이 제대로 되었는지 확인하기
- 예진 시에 기저질환 및 과거 예방접종 후 이상반응 발생 여부,
예방접종 후 주의사항 등을 설명하기
- 귀가 후 마스크를 벗고 바로 비누로 손을 씻고, 손을 씻기 전에는
얼굴, 신체 등을 만지지 않도록 하는 등의 주의사항을 안내하기



접종 후

- 접종 후 피접종자를 의료기관에서 15~30분 간 이상반응 발생 여부
관찰 후 귀가조치 하기
- 이상반응 진단 또는 검안한 경우에 의료기관 소재지 관할 보건소로 신고*

*신고방법

질병보건통합관리시스템 → 예방접종관리 → 예방접종안전관리 → 이상반응 → 병원/보건소 신고관리

